Echinopsis Haku-jo

Beitrag von „Andreas75“ vom 7. Dezember 2020, 16:27

Ah, ok, wusste ich ja nicht- da können wir uns ja die Hand geben, bin nämlich leider auch leichter Asperger.

Und missverstehe schon mal was- wie ich es für Desinteresse halte, wenn zig Cracks auf einem Haufen auch nach Tagen keinen Ton sagen. Oder fühle mich gar persönlich missachtet, weil ich so viel frage. Obwohl das sicher nicht die Spur so gemeint ist.

Dennoch finde ich es einen feinen Zug, wenn egal wer nicht einfach so stehen gelassen wird, sondern zumindest wenige Leute sagen "Nein, nicht damit gearbeitet!" Dann kann man immerhin abschätzen, dass das eher wohl noch niemand versucht hat. Bzw. nichts erwähnenswertes herauskam- wobei man natürlich auch einkalkulieren müsste, dass das Merkmal womöglicherst in der F2 wieder auftaucht.

Wobei aber wohl nur der normalrippige Teil gut ausgebildet blüht, während die seltenen Blüten aus der mutierten Form wohl nur verkrüppelt/ fehlgebildet sein sollen. Das liest man jedenfalls so, wenn man zur Form mal etwas recherchiert.