

Wirksames Insektizid gesucht

Beitrag von „Katja“ vom 28. Mai 2023, 11:40

Das gilt aber nur für Spritzen und weil von dem Zeug kaum etwas in die Pflanzen aufgenommen wird - vermute ich.

Gegossen werden dürfen auch nur Zierpflanzen - weil das dadurch in die Pflanze aufgenommen wird.

Kultur	Schadorganismus/ Zweckbestimmung:	Anwendungsort:	Anwendungs- technik:	Aufwand:	Wartezeit:
Zierpflanzen	Saugende Insekten (Blattläuse, Zikaden, Thripse, Wanzen), Weiße Fliege, Schild-, Woll-, Schmierläuse. Beißende Insekten wie Rüssel- u. Blattkäfer, Raupe, Larven der Blattwespen, Miniermotten)	Gewächshaus und Freiland	spritzen	Zierpflanzen Freiland (Einzelpflanzenbehandlung): 5 ml / 500 ml Wasser Pflanzengröße bis 50 cm: ausreichend für 8,4 m ² ; Pflanzengröße 50 bis 125 cm: ausreichend für 5,6 m ² Zierpflanzen Gewächshaus: 10 ml / 1 Liter Wasser Pflanzengröße bis 50 cm: ausreichend für 16,7 m ² ; Pflanzengröße 50 bis 125 cm: ausreichend für 11,1 m ² ; Pflanzengröße über 125 cm: ausreichend für 8,3 m ²	ohne Bedeutung (N)*
Zierpflanzen im Topf, Container oder Kübel	Blattläuse, Schildlaus-Arten, Woll- und Schmierläuse, Weiße Fliege, Dickmaulrüssler	Freiland, Gewächshaus, Zimmer, Balkone, Terrassen und Wintergärten	gießen	60 ml in 1 Liter Wasser für 10 Liter Substrat	ohne Bedeutung (N)*
Salate	Blattläuse	Freiland	spritzen	5 ml in 500 ml Wasser/10 m ²	3 Tage
Kartoffel	Kartoffelkäfer	Freiland	spritzen	5 ml in 500 ml Wasser/10 m ²	14 Tage
Aubergine, Tomate, Gemüsepaprika	Blattläuse und Weiße Fliege	Gewächshaus	spritzen	5 ml in 500 ml Wasser für 8,3 m ² (Pflanzengröße bis 50 cm) 10 ml in 1 Liter Wasser für 11,1 m ² (Pflanzengröße 50 bis 125 cm) 15 ml in 1,5 Liter Wasser für 12,5 m ² (Pflanzengröße über 125 cm)	3 Tage

*Für die vorgesehenen Anwendungsgebiete ist die Festsetzung einer Wartezeit ohne Bedeutung (N)

www.hybridenforum.com

Das ist die Dosierung von Careo. Da steht 60ml auf 1L Wasser für 10L Substrat. Ich habe zwar die Dosierung für das Wasser immer so benutzt - aber für wieviel Substrat das reicht hängt stark von der Wasseraufnahmefähigkeit des Substrats ab.