

Ab wann frühestens ausräumen?

Beitrag von „Michael.K“ vom 15. März 2012, 18:22

.... Sämlinge sind absolut nicht empfindlicher als die großen, das habe ich bei den winterharten schon getestet. Selbst 1jährige Sämlinge stehen da bei -20°C da ohne Schaden zu nehmen. Warum immer alle glauben. Sämlinge seien empfindlicher entzieht sich meines Wissens. Und pauschal "alle Trichos vertragen Frost bis -10°C" ist ebenso falsch, da es Trichos von wärmeren Gegenden gibt wie solche die auch noch weit darunter vertragen. Ich erinnere nur an div. Gräser Züchtungen die schon meckern wenns mal 5°C hat und dies mit Flecken danken....wenn die Sämlinge von vorn herein "normal" gehalten werden- also nicht gepuscht mit Wärme und zuviel Dünger, dann brauchst Du Dir keine Sorgen machen, dass sie das nicht abkönnen, was die großen ebenso aushalten--- ich habe übrigens schon alles ins ungeheizte Haus geräumt und angegossen. Wenns wirklich noch mal kälter werden sollte wie letztes Jahr (hatte draußen -10°C) schmeiß ich Noppenfolie oder Vlies drüber..bislang bin ich damit bestens gefahren