

# Frühling - Beginn der Wassergaben

Beitrag von „Enrico“ vom 26. März 2010, 19:18

Hallo Stefan

für mich hat das Problem mit den Wassergaben direkt mit den Kulturbedingungen zu tun. Im Treibhaus hat es andere Bedingungen als unter Folie oder direkt ohne Regenschutz im Freiland. Wäre gut, wenn du zu deinen Bedingungen etwas sagen würdest.

Ich giesse meine Echinopsen im Treibhaus 2-3 während der Winterzeit (ein Typ den ich vor vielen Jahren von der Sukki bekommen habe) und fange mit den ersten Wassergaben früh an, d.h. anfangs bis mitte Februar je nach Wetter und Temperatur. Anfangs wenig und ohne Dünger, um die Wurzeln zum Wachstum zu bewegen. Ab Mitte bis Ende Februar auch mit wenig Dünger und ab März normale Düngergaben. Die Echinopsen sind alle am Knospen. Ich habe die Trichocereen im Treibhaus dieses Jahr gleich wie die Echinopsen behandelt und auch bei ihnen sind schon die ersten Knospen da. Es gibt aber sicher mehrere Züchter, die mit Trichos mehr und längere Erfahrung haben als ich. Auch die Hildewintera und ihre -hybriden bekommen früh Wasser.

Bezüglich sprühen bin ich skeptisch, d.h. ich mache es nicht und es macht für mich keinen Sinn, weil die Sukkulente erstens über die Epidermis fast kein Wasser verdunsten, d.h. aber auch keines aufnehmen können. Zweitens kommt der spezielle Stoffwechsel dazu, der es ihnen ermöglicht, die Blattöffnungen während des Tages geschlossen zu halten und während der Nacht zu öffnen, wenn die Verdunstung kleiner ist (beim normalen Stoffwechsel der Pflanzen ist es ja gerade umgekehrt, d.h. bei viel Licht und Wärme sind die Blattöffnungen voll offen, d.h. grosse Verdunstung, aber während der Nacht sind sie fast vollständig geschlossen). Bei Fragen



LG Erich