

Bedornung

Beitrag von „Michael Wolf“ vom 1. Mai 2013, 15:41

Hallo,

ich nehme mal diesen Thread (<http://www.hybridenforum.com/forum/showthread.php?t=2647>) zum Anlass für dieses Posting. Ich finde die **HH.2004.35.OE.1** ebenfalls eine sehr gelungene Züchtung zumal ich mich auch für HWHs interessiere. Mir ist die Bedornung der Pflanze aufgefallen. Es erinnerte mich an eine Pflanze aus meiner Sammlung, siehe unten.

Das ist Trichocereus Hybride vasquezii x PH Tantalos, ich habe die Pflanze 2008 von Michael Kießling erworben. Die Blüte sieht so aus: http://kakteen.abg9.de/images/...zen/TH_K0872_20090618.jpg

Interessant (für mich) ist, das beide Pflanzen aus Pollen von Pseudolobivia-Hybriden entstanden und in der Bedornung ähnlich sind. Wird die Bedornung von Pseudolobivia so beeinflusst oder ist das nur ein Zufall?

Die **HH.2004.35.OE.1** ist ja eine Hybride aus HWH Hoheymouth x Tricho-Hybride, wobei bereits die Honeymouth eine schöne Bedornung besitzt. Und wenn man dieser Seite (http://echinopsis.eu/displayim...id=5358#top_display_media) glauben darf, dann ist Honeymouth aus HWH Butterfley x Pseudolobivia 1 (Hybride?) entstanden.