

verfeinerte Areolenpfropfung

Beitrag von „Stachelbär“ vom 29. Juli 2014, 10:09

Hallo zusammen!

Da ich gerne ppropfe und gute Hybriden vermehre ist mir eine Idee gekommen mit der man noch einfacher und sicherer vermehren kann.

Von einem sich im Trieb befindlichen Kindel, wurzelchet oder gepfropft ist egal, wird der Scheitel auf eine Dauerunterlage gepfroft. In meinem Fall habe ich einen fetten jusbertii tief geschnitten.

Den verbleibenden Stumpf ein paar wochen treiben lassen bis sich erste Veränderungen an den Areolen zeigen.

Wenn man nun die Areolen einzeln (!) ppropft und man mit der Unterlage geübt ist treibt jede aus. Ich bin sogar noch weiter gegangen und habe die Unterlage knapp über dem Boden abgeschnitten und abgeschrägt. Sie ist gerade mal 3cm hoch.

Da der Vermehrungsstumpf gezwungen wurde zu kindel sind die Anlagen in den Areolen besser und sie wachsen leichter an. 😊 Wenn die Areole ein Anzeichen der Vermehrung aufweist treibt sie auch schneller aus. Wenn die Areole schon ein Minikindel hat wächst es munter weiter.

Ich habe von einem namhaften Zücher eine Hybride zur Vermehrung bekommen bei der von 10 "normalen" Areolenpfropfungen nur 2 ausgeschlagen haben. Die "verfeinerte Areolenpfropfung" werde ich an ihr testen und später berichten.

Zur Veranschaulichung meiner bisherigen Erfahrungen hänge ich ein paar Bilder an.

Vermert wurde die FLYING DRAGON (im HJ 1/2014 von mir vorgestellt) und die AN.2007.15.WST03 WÖRLITZ x CANTORA gelb. Beide Blütenbilder sind in meinem Album. Am ersten Bild ist der Vermehrungsstumpf der FLYING DRAGON zu sehen. Bei der habe ich von dem Kindel den Scheitel umgepfropft und man sieht in der Bildmitte den Stumpf von dem ich alle oberen Dornen entfernt habe. Die einzelnen Dornen oben sind neu ausgetrieben und sie sind ein erstes Anzeichen dafür das die Areolen austreiben wollen. Kurz nach dem Foto habe ich eine 1cm Scheibe abgeschnitten und gepfropft. Den Rest vom Stumpf inkl. Unterteil habe gepfroft. Einzelne Areolen dind dabei schneller angewachsen als Rippensegmente. Am 2. Bild sieht man eine ausgeschlagene Areolenpfropfung einer einzelnen Areole auf jusbertii und am 3. Bild den Vermehrungsstumpf der AN.2007.15.WST03 WÖRLITZ x CANTORA gelb mit ersten Azeichen (siehe Pfeil) der Veränderungen an einer der den oberen Areolen. Sie kommt am Wochenende auf die Schlachbank. 😊

Die Messer sind gewetzt! 😊

Ich wünsche viel Spaß beim Pfropfen,