

Schadbild

Beitrag von „Pieks“ vom 25. Oktober 2015, 22:30

Wenn der angesprochene Züchter Andreas Wessner war, hat er mir gegenüber genau das Gleiche geäußert, speziell bei Züchtungen mit "Helianthocereus" huascha-Beteiligung. Seine Empfehlung: nicht so kalt überwintern. Da ich inzwischen zwei Sonnenbräute habe, steht eine im GWH, die andere bekommt im Winter immer eine Extrawurst auf dem Dachbodenfenster gebraten, bei mindestens 10 Grad. Die Gewächshäusige sieht von Jahr zu Jahr übler aus, kann sich aber trotzdem nicht für die Ewigen Jagdgründe entscheiden. Aber sei versichert, dass hier (außer mir) noch mehrere andere Pfleger Deine Beobachtungen gerade bei der Sonnenbraut bestätigen können. Gleiches habe ich übrigens auch an verschiedenen Pfropfungen mit Tr. spachianus als Unterlage. Völlig harmlos zwar, aber eben doch unschön.

Liebe Grüße,

Tim



Mir ist übrigens nicht klar, wie an der Sonnenbraut eine huascha-Beteiligung vorliegen kann.

(Lobivia winteriana x Super Gelb) x Flying Saucer, KE.17.2002.1