

Die Schick Hybriden und Berichte

Beitrag von „Karl1“ vom 5. Dezember 2015, 15:16

Southern Belle 2003 (1674-42)

Einstufung seltene Schick

Blüten sind massiv, manchmal mit den verdrehten inneren Blumenblättern, zu Zoll 5- $\frac{1}{4}$ (13 Zentimeter) darüber. Blumenblätter ausgedehnt, obovate (umgekehrt eiförmige Form des Blütenblattes), gekräuselte, reizende rosafarbene Töne mit einem basalen Kupferbereich. Kehle grün. Staubfäden pink; äußere Staubgefäße, die einen weißen Ring an der Spitze der Kehle bilden. Pflanze wächst wie ein Fass, zu (12 Zentimeter) im Durchmesser; Dornen zu (22 Millimeter) lang.

ISI 2003-5; HBG 89133, Schick 1674-47.

Southern Belle

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/southe10.jpg>]

Enchantment

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/enchan10.jpg>]

Terpsichore

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/terpsi10.jpg>]

Pfropfen

auf *Opuntia humifusa*

Unterlagen: *Opuntia humifusa*

Im Jahr 2014 aufgesetzte Kindel haben im August 2015 schon geblüht.

Kindel konnte ich noch Anfang September ohne Mühe auf die Unterlagen setzen und sind angewachsen.

Die wenigen feinen Dornen sind manchmal lästig, aber mit einer Drahtzange sind die Ohren gut zu bändigen.

Die Ohren brachten reichlich Nachwuchs, konnte sie im freien pflegen und zweimal im Jahre viele neue Ohren von beachtlicher Größe schneiden.

Was auch für die *Opuntia humifusa* sprach ist die Frosthärte. Ich lasse alle im kalten Gewächshaus stehen, es belastet mich nicht im Winterquartier mit Platzproblemen. Die Frosthärte ist nur auch die *Opuntia* zutreffend und nicht auf das Kindel oder Ableger.

Auch Sämlinge habe ich mit großem Erfolg auf die geschnittenen Ohren aufgesetzt. Meist 5 Stück und nach 2 Monaten musste schon welche entfernt werden.

Bei den Kindeln setzte ich oft 3 Stück auf und der Mittelste musste bald weichen. Das Pfropfen auf die Opuntia humifusa muss erlernt werden , denn die Leidadern verlaufen weit am Rande. Das Kindel musste mehr überhängend stehen. Sämlinge habe ich direkt auf die Leidadern gestellt, sind gut sichtbar, ohne Fixierung und ohne gespannte Luft. Alles lief nach Wunsch ab ohne viel Mühe.
Vorsicht mit den Wassergaben besonders beim Wiederbewurzeln.

gepfropfte Sämlinge

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/3_dsc010.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/4_dsc010.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/7_dsc010.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/3a_dsc10.jpg]

Bilder im GWH

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/10_img10.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/10_img11.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/10_bim10.jpg]