

Die Schick Hybriden und Berichte

Beitrag von „Karl1“ vom 11. Dezember 2015, 09:24

Temptress 1997 (622-3)

Einstufung normale Schick

Die Elternschaft ist komplex: *Lobivia famatimensis* X (Stars & Stripes X unbekannte *Echinopsis* Hybride der UCLA-Universität). Die Blütenblätter sind hier einheitlich dunkelrot, mit einer rötlich-lila äußeren Zone und einer dunkelroten inneren Zone.

Blume zu Zoll 4- $\frac{1}{2}$ (11 Zentimeter) darüber. Blumenblätter dunkles satin fuchsia mit tief rot an der Unterseite. Kehlkreis helles pink rot. Staubfäden dunkel fuchsia; Antheren (Polenplättchen) Creme gefärbt; innere Staubgefäße geordnet in einem kompletten Kreis im Blumeschlauch. Narbe dunkelgrün. Pflanzenkörper wächst halbsäulenförmig, zu Zoll 3- $\frac{1}{2}$ (8 Zentimeter) im Durchmesser, schön dunkelgrüner Körper; Dornen fein. Zentrale Dornen zu (8 Millimeter) lang; Areolen nah gesperrt.

ISI 97-32; HBG 80618, Schick 622-3.

Temptress

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/temptr10.jpg>]

Spectre

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/spectr15.jpg>]

Seance

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/seance17.jpg>]

Teil III

Petalen und ihre Formen

[Blockierte Grafik: <http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/petale10.jpg>]

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/6_raou10.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/6_cass10.jpg]

Petalen 1, Raoul Wallenberg, Cassandra

Nach einer eindeutigen Beschreibung der Petalen hätte man hier schon für Abhilfe schaffen

können.

In der mir vorliegenden Literatur ist kaum etwas über die Bestimmung der Sorten mit Hilfe der Petalen geschrieben worden.

Hier müssen die Petalen in den verschiedenen Formen beschrieben werden und mit Bildern für ein besseres Verständnis sorgen.

Die Petalen Beschreibungen kann man in drei Teile erfassen.

1. Petalen Formen

2. Petalen Spitzen

3. Petalen Farbverlauf und Farbzonen

Ich möchte mich hier mit Teil 1 beschäftigen. Es ist ein Merkmal was sich ständig wiederholt und für die Sorte aussagefähig ist.

Es wurden rund 10 Gruppen beschrieben und diese Einordnung kann auf jede Neuzüchtung angewendet werden und 3 Gruppen in gefranste, gewellte, und gezackte Formen

In dem Artikel will ich alles mit Bildern unterstreichen.

Habe mich nach den Vorgaben von Dr. Bob Schick gehalten.

TH Neuheiten in Bildern aus dem Jahre 20014 / 2015

TH (Gr. Freude x Tr. vatteri) X Abendrot

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/th_gr_10.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i68.servimg.com/u/f68/14/92/99/96/th_gr_11.jpg]